

С Т А Н О В И Щ Е  
От доц. Валентина Цекова  
Н-к Клиника по медицинска онкология  
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

Относно: Левкостимулиращо действие на препарата Маоло

На Клиниката бяха предоставени мостри от препарата Маоло за придобиване на впечатления от неговото левкостимулиращо действие при болни с индуцирана от химиотерапия левкопения. Препаратът беше приложен за лечение на лека и умерено тежка левкопения, като първоначално използваната доза беше 1 капсула дневно. Макар че се отчете покачване на левкоцитите с тази доза, нормализирането им се постигна бавно – едва след 10-дневно лечение. Поради това при следващите болни дозата беше увеличена на две капсули дневно, което доведе до нормализиране на левкоцитния брой в рамките на 3-5 дни както при лекостепенните, така и при умерено тежките левкопении. В допълнение на левкостимулиращия ефект болните съобщиха, че се чувстват по-бодри и с по-добро самочувствие по време на приема на Маоло. Не са установени нежелани странични реакции от препарата.

В заключение, препаратът Маоло има много добър левкостимулиращ ефект при болни с лека и умерено тежка левкопения, индуцирана от химиотерапия. Понася се добре от болните, без да се установяват нежелани лекарствени реакции.

22.07.2010 г.

